

## **SITUACIÓN DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE COLON EN ESPAÑA**

En España, este programa se incorporó a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2014 (Orden SSI/2065/2014), especificando que las CCAA tendrían 5 años para iniciar su implantación y 5 más para alcanzar una cobertura próxima al 100% de la población.

- Población objetivo: hombres y mujeres entre 50 y 69 años.
- Prueba de cribado: sangre oculta en heces (SOH).
- Intervalo entre exploraciones: 2 años.

El programa ofrece a la población objetivo una prueba de detección de CCR gratuita cada dos años. El protocolo de cribado incluye los siguientes aspectos:

- Invitación: las personas en el rango de edad de 50-69 años son invitados a participar a través de una carta de invitación enviada por correo postal.
- Prueba de SOH: la prueba se realiza en casa y se entrega, por lo general, en el centro de salud correspondiente.
- Colonoscopia: en aquellos casos en los que la prueba de SOH resulte positiva, se ofrece una colonoscopia como prueba de confirmación diagnóstica.
- Seguimiento y tratamiento de acuerdo con las guías de práctica clínica actualizadas y protocolos clínicos en caso de detectar un CCR o lesiones premalignas.

Además del programa de cribado, en el caso de las personas que cumplen criterios de alto riesgo personal o riesgo de cáncer familiar o hereditario se realiza la valoración del riesgo individual y su seguimiento a través de protocolos de actuación específicos.

Se estima que es necesario un nivel de participación superior al 60% para lograr una reducción costo-efectiva de la mortalidad por CCR en los programas de cribado poblacional. Según los criterios de la Guía Europea de calidad para el cribado de cáncer colorrectal, se recomiendan índices de participación superiores al 65%-70%, si bien se explicita un nivel mínimo aceptable del 45%. En España, la última actualización de la Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud propone como objetivo obtener un mínimo de 65% de participación en los programas de cribado de CCR.

Actualmente, todas las CCAA han iniciado su implementación, aunque aún existen diferencias de participación entre las distintas CCAA o entre distintos grupos sociodemográficos. Según la Red de Programas de Cribado de Cáncer, la cobertura en 2017 fue del 44% de la población diana, y la tasa de participación del 46%, observándose una alta heterogeneidad entre CC. AA. (19%-74%) Es prioritario incrementar la información a la población y las ventajas de la detección precoz del cáncer colorrectal con el fin de aumentar la tasa de participación.

### **Situación por CCAA:**

En general, los programas de cribado de las distintas CCAA están destinados a una población de entre 50-69 años salvo: Aragón (60-69 años), Ceuta (60-69 años) y Extremadura (55-69 años).

*Tabla 1. Tabla resumen del cribado de CCR de las distintas CCAA.*

CCAA/Ciudad autónoma	Población diana	Año de inicio
Andalucía	50-69 años	2014
Aragón	60-69 años	2014
Asturias	50-69 años	2015
Baleares	50-69 años	2015
Canarias	50-69 años	2009
Cantabria	50-69 años	2008
Castilla la Mancha	50-69 años	2015
Castilla y León	50-69 años	2010
Cataluña	50-69 años	2000
Ceuta	60-69 años	2017
Comunidad Valenciana	50-69 años	2005
Extremadura	55-69 años	2016
Galicia	50-69 años	2013
La Rioja	50-69 años	2010
Madrid	50-69 años	2017

Melilla	50-69 años	2017
Murcia	50-69 años	2006
Navarra	50-69 años	2014
País Vasco	50-69 años	2009

El objetivo del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer es que, de aquí a 2025, el 90% de la población de la Unión que cumpla los requisitos para someterse a un cribado del cáncer colorrectal tenga acceso a dicho cribado. También plantea la posibilidad de ampliar el cribado selectivo, para incluir otros cánceres, como el cáncer de próstata, de pulmón y gástrico. En concreto, en cáncer colorrectal, el grupo de trabajo del ECICC está trabajando en el desarrollo de recomendaciones para el cribado de cáncer colorrectal que abarquen otros rangos de edad y diferentes tipos de pruebas.

#### **REFERENCIAS:**

<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/cribado/cancer/colorrectal.htm> (consultado en diciembre 2023)

[https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/en/ecicc/european-colorectal-cancer-guidelines?topic=283&usertype=282&filter\\_11=288&updatef2=0](https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/en/ecicc/european-colorectal-cancer-guidelines?topic=283&usertype=282&filter_11=288&updatef2=0) (consultado en diciembre 2023)

[https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/cancer/docs/Estudio\\_impacto\\_publicado.pdf](https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/cancer/docs/Estudio_impacto_publicado.pdf) (consultado en diciembre 2023)

[https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos\\_propios/resp/revista\\_cdrom/VOL97/ORIGINALES/RS97C\\_202308063.pdf](https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL97/ORIGINALES/RS97C_202308063.pdf) (consulta en diciembre 2023)

Molina-Barceló A, Moreno Salas J, Peiró-Pérez R, et al. Desigualdades de acceso a los programas de cribado del cáncer en España y cómo reducir las: datos de 2013 y 2020. Rev Esp Salud Pública. 26 de enero;95:e1-28.