

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA E INTENSIDAD DEL DOLOR EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR MODERADO-INTENSO, SIN TRATAMIENTO PREVIO CON OPIOIDES

Dr. Mariano Provencio Pulla

Jefe de servicio de Oncología Médica

H. Puerta de Hierro, Majadahonda,

Dr. López Calderero; Dra. Cristina Martín Lorente, Dr. Luis Zugazabeitia Olabarria, Dr. Juan Luis Martí Ciriquian, Dr. Miguel Angel Núñez Viejo; Dr. José M^a García Bueno; Dra. Dolores Isla Casado; Dr. Paula Jiménez Fonseca y Dr. Jorge Contreras Martínez ,

en nombre de los investigadores del estudio C2

Subanálisis de estudio observacional, multicéntrico

3 meses de seguimiento

Población

Pacientes oncológicos **naïve a opioides**

con dolor moderado-intenso ($\text{NRS}_{0-10} \geq 4$)

Tratamiento

oxicodona/naloxona (OXN) vs otros opioides



Objetivos

- Evolución del dolor: BPI-SF
- Calidad de vida: Escala EuroQoL-5D
- Función intestinal: BFI


OXN N=263

Opioides ≠ OXN N=150

Varones	62,7%	67,3%	
Edad (media ±DE; años)	65,9 ± 12	62,2 ± 11	p=0,002
ECOG 0-1	66,2%	60,7%	p=0,237
Quimioterapia	66,9%	74,0%	p=0,877
Radioterapia	36,1%	26,7%	p=0,008
Edmonton ECS-CP*			
Estadío II, mal pronóstico	96,6%	96,0%	p=0,763
EQ-5D (termómetro ₀₋₁₀₀)**	45 puntos	46 puntos	p=0,465




Evolución de la intensidad del dolor



*Cuestionario BPI(NRS₀₋₁₀)

Evolución de la intensidad del dolor




Pacientes OXN: 50-60% alivio del dolor: Mejoría sustancial
Pacientes OP_{≠OXN}: 40-50% alivio: Mejoría moderadamente significativa
OXN vs OP_{≠OXN}: Mejoría significativa, a favor de OXN Criterios IMMPACT

... y del impacto del dolor en la calidad de vida

Actividades en gral. Ánimo Caminar Trabajar Relaciones Sueño Disfrute vida


Impacto del dolor en la CdV
Cuestionario BPI (M3-basal)



OXN OP ≠ OXN




... y del impacto del dolor en la calidad de vida



Mejora significativas del impacto del dolor en la CdV.
Pacientes tratados con OXN vs con OP_{≠OXN}: Mejorías significativas en todas las dimensiones, a favor de OXN


Evolución de la función intestinal




Pacientes OXN: Preservaron su función intestinal normal
Pacientes OP_{≠OXN}: Empeoran su función intestinal.



Evolución del % de pacientes CON problemas



Evolución del % de pacientes CON problemas



Pacientes tratados con OXN: ↓ tasa de pac. con problemas, ≈ 25% vs pacientes tratados con OP_{≠OXN}: ↓ ≈ 10%

**Los pacientes naive a opioides, en su primera visita por dolor:
Presentan un dolor de mal pronóstico,
con un elevado impacto su su calidad de vida.**

**El tratamiento con opioides obtiene unas tasas muy altas de
analgesia, mejoría de la calidad de vida y de la función intestinal**

**Cuando se comparan los dos grupos de tratamiento
(OXN, vs OP_{≠OXN}) los resultados son significativamente
mejores para los pacientes tratados con OXN
(analgesia, impacto del dolor en su CdV y función intestinal)**