

Sedación terminal

Sedación por síntomas intratables cerca del final de la vida.

Sedación paliativa

Sedación inducida por fármacos , sin intención de causar la muerte, utilizando sustancias no opioides, para controlar síntomas agudos, refractario y severos en pacientes con expectación próxima de muerte.

Sedación paliativa

Tiempo hasta la muerte

Referencia	Días (media)
García A	1,9
Cowan ID	1-29 -
Fainsinger RL	1,9-3,2
Taiwanese	5

Sedación paliativa

- **La sedación paliativa no es una eutanasia**
 - **No acorta necesariamente la vida**
 - **Principio del doble efecto**
 - **Dosis de fármacos requeridas para paliación, no para eutanasia**

SEDACIÓN PALIATIVA

Indicaciones de la sedación paliativa según síntomas

Síntomas	Frecuencia% (A. García)	Frecuencia % (Cowan JD*)
Dolor	36	21
Agitación/Confusión	31	40
Disnea	40	12
Ansiedad/Angustia	26	9
Contracturas muscul.	?	11
Trastornos gastroint.	13	?
Otras	?	7

SEDACIÓN PALIATIVA

Fármacos utilizados en la sedación

Fármaco	Frecuencia% (A. García)	Frecuencia % (Cowan JD*)
Midazolán	80	26
Sed/hipnótico	2	6
Morfina	75	-
Neurolépticos	10	23
Propofol	-	1

Sedación paliativa

■ Selección de pacientes:

- Enfermedad avanzada irreversible con muerte inminente
- Responden a la orden de “no resucitación”
- Reciben tratamiento solo con indicación de control de síntomas

Síntomas severos

Refractarios

Información

Consentimiento